

# Island Digestive Disease Consultants

400 W. Main St. STE 300 Babylon, NY 11702

T: 631-321-6400 F: 631-321-2969

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: **VER ABAJO LA UBICACION PROGRAMADA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b><u>Island Digestive Health Center</u></b><br><b>471 Montauk Highway</b><br><b>West Islip, NY 11795</b><br><b>631-376-2260</b><br><b><u>ARRIVAL TIME:</u> CONTACTS YOU 2 DAYS PRIOR TO<br/>PROCEDURE (ALSO SENDS TEXT MESSAGES)</b> | <input type="checkbox"/> <b><u>Good Samaritan Hospital</u></b><br><b>1000 Montauk Highway</b><br><b>West Islip, NY 11795</b><br><b>631-376-4808</b><br><b><u>ARRIVAL TIME:</u> CONTACTS YOU THE EVENING<br/>PRIOR TO PROCEDURE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Preparación para la Endoscopia/ERCP/EUS/ENDOFLIP**

**USTED ESTA TOMANDO MEDICINA GLP- 1** – Mounjaro, Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Trulicity, Byetta, Bydurean, Adlyxin, Victoza, Saxenda, Zepbound, Semaglutide, Trizepatide, etc  
**\*\*DEBE DE PARAR EL MEDICAMENTO UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO\*\***

**USTED DEBE DE ESTAR EN UNA DIETA DE LIQUIDOS CLAROS EL DIA COMPLETO ANTES DE SU PROCEDIMIENTO!**

**LIQUIDOS CLAROS INCLUYE:** agua, te, café negro, helados, sopas claras sabor a pollo, res o vegetales, gelatina sabor a **naranja** o **limon**, jugo de manzana y limonada.

**DEBE DE SUSPENDER TODOS LOS LIQUIDOS AL MENOS 6 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO**

- Medicamentos para la **DIABETES**? No se tome su medicamento para la Diabetes el día de su Procedimiento.
  - **Invokana/Farxiga/Jardiance/Synjardy** – Debe de **SUSPENDER** el medicamento **durante 3 dias** antes del procedimiento. **De lo contrario, se reprogramara el procedimiento.**
- Medicamentos para la **PRESION ALTA**? **NO SE SALTE UNA DOSIS!** Si la toma en la mañana, tomar medicamento con un poco de agua.
- **ANTICOAGULANTES** (COUMADIN, PLAVIX, WARFARIN, XARELTO, ETC) Debe de discutir con su cardiologo sobre parar las medicinas **ANTES** de su procedimiento. **TODOS LOS OTROS MEDICAMENTOS DEBE DE BEBERLOS CON UN POCO DE AGUA.**

## **EN EL DIA DE LA ENDOSCOPIA**

- **NO MASTIQUE CHICLE, DULCE, OR FUME (INCLUYE VAPEAR)**
- **NO COMIDA OR LIQUIDOS INCLUYENDO AGUA**
- **NO SE APLIQUE locion a la piel**
- Por favor traiga su identificacion y copago, si es requerido, y **dejar prendas/articulos de valor en la casa.**

## **DESPUES DE SU ENDOSCOPIA**

Necesitara una persona que lo lleve a su casa. NO puede tomar transporte publico al menos que este acompañado por un conocido. No puede conducir por el resto del dia. Al despertar puede sentirse despierto y alerta; sin embargo se administran medicamentos durante el procedimiento para sedarlo lo cual le es posible que disminuyan su juicio, tiempo de reaccion y sus reflejos por un periodo mas largo. NO debe de regresar al trabajo por el resto del dia despues del procedimiento.